

Листок-вкладыш – информация для потребителя

ПИКЛОНОРД®, 0,5 мг/мл, капли глазные

Действующее вещество: пиклоксидин

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Всегда применяйте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Если состояние не улучшается или оно ухудшается, Вам следует обратиться к врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат ПИКЛОНОРД®, и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата ПИКЛОНОРД®.
3. Применение препарата ПИКЛОНОРД®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата ПИКЛОНОРД®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат ПИКЛОНОРД® и для чего его применяют

Препарат ПИКЛОНОРД® содержит действующее вещество пиклоксидин, относящееся к группе бигуанидинов. При местном применении пиклоксидин оказывает противомикробное и антисептическое действие при инфекциях глаз, вызванных бактериями, а также некоторыми вирусами и грибами

Показания к применению

Препарат ПИКЛОНОРД® показан к применению у взрослых и детей от 0 лет при:

- бактериальных инфекциях переднего отдела глаза;
- дакриоцистите.

Также препарат применяется для профилактики инфекционных осложнений в послеоперационном периоде после хирургических вмешательств в области переднего отдела глаза.

Способ действия препарата ПИКЛОНОРД®

Пиклоксидин – производное бигуанидинов, противомикробное средство, оказывает антисептическое действие. Активен в отношении *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus faecalis*, *Escherichia coli*, *Eberthella typhosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Shigella dysenteria*, *Bacillus subtilis*, *Chlamidia trachomatis*; некоторых вирусов и грибов.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата ПИКЛОНОРД®

Противопоказания

Не применяйте препарат ПИКЛОНОРД®

– если у Вас аллергия на пиклоксидин или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша).

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата ПИКЛОНОРД® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Не используйте препарат ПИКЛОНОРД® для инъекций в конъюнктиву глаза и не вводите в переднюю камеру глаза.

Препарат ПИКЛОНОРД® не изменяет цвет контактных линз (включая мягкие гидрофильные), однако при инфекционных заболеваниях ношение контактных линз противопоказано.

Другие препараты и препарат ПИКЛОНОРД®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы применяете, недавно применяли или можете начать применять какие-либо другие препараты, в том числе отпускаемые без рецепта.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Не применяйте препарат ПИКЛОНОРД® в период беременности.

Грудное вскармливание

Не применяйте препарат ПИКЛОНОРД® в период грудного вскармливания. Во время применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат ПИКЛОНОРД® оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Препарат может вызывать снижение четкости зрения. При наличии данного симптома, воздержитесь от управления транспортными средствами и работы с механизмами.

Детям, применяющим препарат, при снижении четкости зрения запрещено управлять велосипедами и самокатами.

3. Применение препарата ПИКЛОНОРД®

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза:

Бактериальные инфекции

По 1 капле 2-6 раз в сутки.

Послеоперационный период

По 1 капле 3-4 раза в сутки.

Для профилактики послеоперационных осложнений (предоперационная подготовка)

По 1-2 капли препарата непосредственно перед хирургическим вмешательством.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста

Коррекция дозы не требуется.

Пациенты с нарушениями функции печени и почек

Коррекция дозы не требуется.

Применение у детей и подростков

Коррекция дозы не требуется.

Путь и способ введения

Препарат ПИКЛОНОРД® предназначен для закапывания в глаза независимо от приема пищи.

Способ введения

В конъюнктивальную полость пораженного глаза (пораженных глаз).

1. Вымойте руки.
2. Откройте флакон. Обратите особое внимание, чтобы кончик флакона-капельницы не касался глаза, кожи вокруг глаза или пальцев.
3. Наклоните голову назад и держите флакон вверх дном над глазом.
4. Оттяните нижнее веко вниз и посмотрите вверх. Удерживая и осторожно сжимая флакон с двух сторон, закапайте одну или две капли в пространство между глазом и нижним веком.
5. Прижмите палец к уголку глаза, к носу или закройте глаза на 2 минуты. Это поможет предотвратить попадание препарата в кровоток.
6. Повторите шаги с 3 по 5 для второго глаза, если это рекомендовано врачом.
7. Плотно закрутите флакон колпачком.

Если Вы применяете другие глазные капли или мази для глаз, выдерживайте интервал не менее 15 минут между применениями каждого из препаратов. Глазные мази следует применять в последнюю очередь.

Продолжительность терапии

Продолжительность лечения при бактериальных инфекциях глаз 10 дней. Необходимость продления срока лечения >10 дней определяется врачом.

При других показаниях продолжительность лечения определяется врачом.

Если Вы применили препарат ПИКЛОНОРД® больше, чем следовало

Промойте глаза теплой водой.

Если Вы забыли применить препарат ПИКЛОНОРД®

Если вы забыли применить препарат ПИКЛОНОРД®, то примените его как можно скорее в дозе, предписанной врачом. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата ПИКЛОНОРД®

Не прекращайте лечение, не посоветовавшись с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат ПИКЛОНОРД® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

При применении препарата ПИКЛОНОРД® возможно возникновение аллергических реакций, проявляющихся покраснением конъюнктивы.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: <https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>.

5. Хранение препарата ПИКЛОНОРД®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на пачке картонной после «Годен до».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Препарат не требует специальных условий хранения.

Используйте в течение 28 дней после первого вскрытия флакона-капельницы.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат ПИКЛОНОРД® содержит

Действующим веществом является пиклоксидин. 1 мл препарата содержит 0,5 мг пиклоксидина (в виде дигидрохлорида).

Прочими вспомогательными веществами являются декстроза (глюкоза) безводная, полисорбат 80, вода очищенная.

Внешний вид препарата ПИКЛОНОРД® и содержимое его упаковки

Препарат ПИКЛОНОРД® капли глазные представляет собой прозрачный бесцветный или слегка желтоватый раствор.

По 5 или 10 мл лекарственного препарата во флаконы-капельницы, укупоренные пробками-капельницами и крышками навинчивающимися. На флаконы-капельницы наклеивают этикетки. 1 флакон-капельницу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Держатель регистрационного удостоверения:

Россия

НАО «Северная звезда»

Юридический адрес:

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, помещ. 47

Тел/факс: +7 (495)137-80-22

Электронная почта: electro@ns03.ru

Производитель (первичная упаковка):

Россия

АО «Диафарм»

Московская обл., г. Люберцы, ул. Митрофанова, д. 20а.

Производитель (вторичная упаковка):

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, территория Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарьская, зд. 2

Выпускающий контроль качества:

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, территория Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарьская, зд. 2, лит. Е

тел/факс: +7 (812) 409-11-11

электронная почта: safety@ns03.ru

Все претензии от потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, территория Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2, лит. Е

тел/факс: +7 (812) 409-11-11

телефон горячей линии: +7 (800) 333-24-14

электронная почта: safety@ns03.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза: <https://ees.eaeunion.org/>