

Листок-вкладыш – информация для пациента
НОРДСИПИН-СЗ, 10 мг/мл, капли глазные
Действующее вещество: метилэтилпиридинол

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу.

Препарат назначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы их заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу.

Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат НОРДСИПИН-СЗ и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед применением препарата НОРДСИПИН-СЗ.
3. Применение препарата НОРДСИПИН-СЗ.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата НОРДСИПИН-СЗ.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат НОРДСИПИН-СЗ и для чего его применяют

Лекарственный препарат НОРДСИПИН-СЗ содержит действующее вещество метилэтилпиридинол, которое относится к группе средств, применяемых в офтальмологии для лечения и защиты роговицы.

Показания к применению

Препарат НОРДСИПИН-СЗ применяется для лечения у взрослых в возрасте от 18 лет.

Для лечения и профилактики:

- воспалений и ожогов роговицы;
- кровоизлияний в переднюю камеру глаза;
- кровоизлияний в склеру у лиц пожилого возраста;
- тромбоза центральной вены сетчатки и ее ветвей;
- осложнений близорукости;
- повреждения сетчатки глаза на фоне сахарного диабета.

Для защиты роговицы при ношении контактных линз.

Способ действия препарата НОРДСИПИН-СЗ

Препарат НОРДСИПИН-СЗ улучшает микроциркуляцию в тканях глаза, стимулирует восстановительные процессы в роговице.

Если улучшение не наступило или Вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата НОРДСИПИН-СЗ

Противопоказания

Не применяйте препарат НОРДСИПИН-СЗ:

- если у Вас аллергия на метилэтилпиридинол или любые другие компоненты препарата (перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша);
- если Вы беременны или кормите грудью;
- у детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед применением препарата НОРДСИПИН-СЗ проконсультируйтесь с лечащим врачом. При необходимости одновременного применения других глазных капель препарат закапывают последним, после полного всасывания предыдущего лекарственного препарата (не ранее, чем через 15 минут).

Дети и подростки

Препарат НОРДСИПИН-СЗ противопоказан к применению у детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет (см. раздел «Противопоказания»).

Другие препараты и препарат НОРДСИПИН-СЗ

Не смешивайте препарат с другими лекарственными растворами.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Беременность

Препарат НОРДСИПИН-СЗ противопоказан в период беременности (см. раздел «Противопоказания»).

Грудное вскармливание

Препарат НОРДСИПИН-СЗ противопоказан в период грудного вскармливания (см. раздел «Противопоказания»).

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Нет данных о влиянии на управление автотранспортом и занятия потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Препарат НОРДСИПИН-СЗ содержит натрия бензоат

Препарат НОРДСИПИН-СЗ содержит натрия бензоат, который слабо раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки.

3. Применение препарата НОРДСИПИН-СЗ

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом.

Рекомендуемая доза

По 1–2 капли 2–3 раза в день.

Применение у детей и подростков

Препарат НОРДСИПИН-СЗ противопоказан для детей и подростков в возрасте от 0 до 18 лет.

Путь и способ введения

Препарат НОРДСИПИН-СЗ предназначен для закапывания в глаза.

1. Вымойте руки.
2. Откройте флакон-капельницу. Обратите особое внимание, чтобы кончик флакона-капельницы не касался глаза, кожи вокруг глаза или пальцев. Это позволит избежать загрязнения препарата микроорганизмами.
3. Наклоните голову назад и держите флакон-капельницу вверх дном над глазом.
4. Оттяните нижнее веко вниз и посмотрите вверх. Удерживая и осторожно сжимая флакон-капельницу с двух сторон, закапайте одну или две капли в пространство между глазом и нижним веком.
5. Прижмите палец к уголку глаза, к носу или закройте глаза на 2 минуты. Это поможет предотвратить попадание препарата в кровоток.
6. Повторите шаги с 3 по 5 для второго глаза, если это рекомендовано врачом.
7. Плотно закройте флакон-капельницу колпачком.

Продолжительность терапии

Продолжительность курса лечения зависит от течения заболевания (обычно составляет 3–30 дней) и определяется врачом.

При необходимости и хорошей переносимости препарата курс лечения может быть продолжен до 6 месяцев или повторяться 2–3 раза в год.

Если Вы применили препарата НОРДСИПИН-СЗ больше, чем следовало

Случаи передозировки препаратом не описаны.

Если вы применили препарата больше, чем следовало, обратитесь к врачу. При возможности возьмите с собой упаковку и листок-вкладыш, чтобы показать врачу, какой препарат Вы применили.

Промойте глаза теплой водой. Не закапывайте капли, пока не наступит время для следующего запланированного закапывания.

Если Вы забыли применить препарат НОРДСИПИН-СЗ

Если вы забыли применить препарат НОРДСИПИН-СЗ, то примените как можно скорее в дозе, предписанной врачом. Если пропуск дозы составляет 8 часов и более, примените препарат в следующее запланированное время. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если Вы прекратили применение препарата НОРДСИПИН-СЗ

Не прекращайте применение препарата НОРДСИПИН-СЗ, не посоветовавшись с врачом.

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат НОРДСИПИН-СЗ может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Возможные нежелательные реакции, которые могут наблюдаться при применении препарата НОРДСИПИН-СЗ с неизвестной частотой (исходя из имеющихся данных частоту возникновения определить невозможно):

- местные аллергические реакции;
- жжение;
- зуд;
- кратковременное покраснение слизистой оболочки глаза (*гиперемия конъюнктивы*).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом. К ним относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Российская Федерация
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Телефон: +7 (800) 550-99-03
Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru
Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
<http://roszdravnadzor.gov.ru/>

5. Хранение препарата НОРДСИПИН-СЗ

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на флаконе-капельнице и пачке картонной после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат в оригинальной упаковке (флакон в пачке) при температуре не выше 25 °С.

Срок годности после вскрытия флакона-капельницы – 28 суток.

Не выливайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат НОРДСИПИН-СЗ содержит

Действующим веществом является метилэтилпиридинола гидрохлорид.

1 мл раствора содержит 10,0 мг метилэтилпиридинола гидрохлорида.

Вспомогательными веществами являются: гидроксипропилбетадекс, калия дигидрофосфат, натрия бензоат, натрия гиалуронат, динатрия гидрофосфат безводный, динатрия эдетата дигидрат, фосфорной кислоты раствор 2 М, вода для инъекций.

Внешний вид препарата НОРДСИПИН-СЗ и содержимое упаковки

Препарат НОРДСИПИН-СЗ представляет собой прозрачную бесцветную или слегка окрашенную жидкость.

По 5 или 10 мл лекарственного препарата во флаконы-капельницы полипропиленовые, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми и навинчиваемыми крышками или во флаконы-капельницы полиэтиленовые из полиэтилена высокого давления, укупоренные пробками-капельницами полиэтиленовыми из полиэтилена высокого или низкого давления и навинчиваемыми крышками из полиэтилена низкого давления.

На флаконы-капельницы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной или писчей, или самоклеящиеся.

1 флакон-капельницу вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную из картона для потребительской тары.

Держатель регистрационного удостоверения

Россия

НАО «Северная звезда»

Юридический адрес:

111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 34, этаж 2, помещ. 47

тел/факс: +7 (495) 137-80-22

электронная почта: electro@ns03.ru

Производитель (первичная упаковка)

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2

Производитель (вторичная упаковка)

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2

Выпускающий контроль качества

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2, лит. Е;

Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2

тел/факс: +7 (812) 409-11-11

электронная почта: safety@ns03.ru

Все претензии от потребителей следует направлять представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения

Россия

НАО «Северная звезда»

Ленинградская обл., муниципальный район Ломоносовский, с.п. Низинское, тер. Производственно-административная зона Кузнецы, ул. Аптекарская, зд. 2, лит. Е

тел/факс: +7 (812) 409-11-11

телефон горячей линии: +7 (800) 333-24-14

электронная почта: safety@ns03.ru

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб-сайте Союза:
<https://eec.eaeunion.org/>