

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата ВИНПОЦЕТИН

Регистрационный номер: Р №003606/01;

Торговое название: Винпоцетин-СЗ;

Международное непатентованное название: Винпоцетин;

Химическое название: этил-(Зальфа, 1бальфа) – эбурнаменин-14 – карбоксилат;

Лекарственная форма: таблетки;

Состав: Одна таблетка содержит Винпоцетина 5 мг и вспомогательные вещества (сахар молочный, крахмал картофельный, тальк, магния стеарат, целлюлоза микрокристаллическая, желатин медицинский);

Описание: Таблетки белого или белого с желтоватым оттенком цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской. Фармакотерапевтическая группа: церебровасодилатирующее средство;

Код АТХ: [N06BX18];

Фармакологические свойства: Обладает сосудорасширяющим, антигипоксическим и антиагрегационным действием. Ингибирует фосфодиэстеразу и повышает содержание циклического аденозинмонофосфата в клетках, что, в свою очередь, приводит к снижению содержания кальция в цитоплазме гладкомышечных клеток и расслаблению миофибрилл. Сочетает сосудистое и метаболическое действия. Расширяет сосуды мозга, усиливает кровоток, преимущественно в ишемизированных областях, улучшает снабжение мозга кислородом. Способствует утилизации глюкозы и повышает уровень катехоламинов в центральной нервной системе, стимулирует метаболизм норадреналина и серотонина в тканях мозга.

Уменьшает агрегацию тромбоцитов, вязкость крови, способствует повышению деформируемости эритроцитов и нормализации венозного оттока на фоне снижения сопротивления мозговых сосудов. Системное артериальное давление незначительно понижается.

Эффективен в остром периоде инсульта: ускоряет регресс общемозговой и очаговой неврологической симптоматики, улучшает память, внимание, интеллектуальную продуктивность. В пожилом и старческом возрасте чувствительность мозговых сосудов к релаксирующему действию винпоцетина возрастает, что обусловлено сенсibilизацией системы аденилатциклазы – циклического аденозинмонофосфата при старении. Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность около 60 %. Максимальная концентрация в плазме крови достигается через 1 час. Легко диффундирует через гистогематические барьеры (в том числе и через гематоэнцефалический барьер) и проникает в ткани. Период полувыведения около 5 часов;

Показания к применению: Острые (после окончания курса парентерального введения винпоцетина, а также в случаях, когда парентеральное введение не показано или невозможно) и хронические формы недостаточности мозгового кровообращения (в том числе острая и резидуальная стадии инсульта, транзиторные ишемические атаки, энцефалопатии, мультиинфарктная деменция). Сосудистые заболевания сетчатки и/или сосудистой оболочки глаза (вследствие атеросклероза, ангиоспазма,

тромбоза); дегенеративные изменения желтого пятна, вызванные атеро-склерозом или ангиоспазмом; вторичная глаукома (вследствие обтурации сосудов). Возрастные сосудистые или токсические (медикаментозные) нарушения слуха, болезнь Меньера, головокружения лабиринтного происхождения. Вегетативные проявления климактерического синдрома;

Противопоказания: Гиперчувствительность, выраженные нарушения ритма сердца, ишемическая болезнь сердца (тяжелое течение), острая стадия геморрагического инсульта, беременность, период лактации. Способ применения и дозы Внутрь по 5 мг (1 таб) 3 раза в день в течение 2 месяцев. Перед отменой препарата следует постепенно снижать дозировку. Возможны повторные курсы 2-3 раза в год. Побочное действие Снижение артериального давления, тахикардия, экстрасистолия, замедление внутривентрикулярной проводимости;

Передозировка: При интоксикации рекомендуются промывание желудка, прием активированного угля и симптоматическое лечение. Взаимодействие с другими лекарственными средствами Повышает риск геморрагических осложнений на фоне гепаринотерапии;

Форма выпуска: Таблетки по 5 мг По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 2, 3 или 5 контурных ячейковых упаковки в пачке картонной;

Условия хранения: Список Б. В сухом защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности 2 года. Не использовать после даты, указанной на упаковке;

Условия отпуска из аптек: По рецепту;

Производитель: ЗАО «Северная звезда»;

Адрес производства: 188663, Россия, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. п. Кузьмолловский, тел./факс: (812) 320-79-48.